

Carraca europea (*Coracias garrulus*)

En el Delta del Llobregat la carraca europea es un migrante escaso, pero regular. Presente en mayor número durante el paso prenupcial, aunque también hay las citas en el paso postnupcial.

En Catalunya es una especie reproductora, en L'Empordà y en la plana de Lleida, pero en bajo número de parejas. Esto puede justificar la presencia de ejemplares tardíos y tempranos en el paso, y tratarse de ejemplares de estas colonias reproductoras tan próximas.

Dado su estado de conservación en Catalunya y el resto del estado, la presencia de esta especie siempre es relevante. Según la propia UICN, la carraca está catalogada como VULNERABLE.

Aportamos el comentario que el Consorci incluye en la “*Memòria de Gestió 2019*” publicada por el **Consorci per a la Protecció i Gestió del Espais Naturals del Delta del Llobregat** en su web:

Memòria de Gestió 2019

Gaig blau (Coracias garrulus): espècie regular però escassa en migració, entre abril – juny i agost - setembre. Normalment s’observen exemplars solitaris o en parelles, però destaca l’observació de 6 exemplars el mes de maig de 2019 al Remolar.

Para esta especie adjuntamos una **tabla elaborada con los datos publicados en *Ornitho.cat*** durante los últimos 10 años.

Con el objeto de facilitar su consulta, al final de este mismo documento incluimos el **resumen de la tabla referida** al número de ejemplares contabilizados en las diferentes observaciones.

Las columnas indican las observaciones realizadas en las dos zonas: en la reserva natural y en el conjunto de las zonas no protegidas. En la última columna se obtiene el porcentaje de ejemplares fuera de zonas protegidas respecto al total.

También aportamos, un **plano de distribución en el Delta**.

En este caso **hemos aplicado un factor de corrección**, ya que consideramos que su presencia en las zonas agrícolas está infravalorada. Como se puede observar en el plano, la especie se distribuye por el conjunto del Parc Agrari. Se concentra en la zona donde se concentran los observadores y disminuye en las menos prospectadas y con menor tiempo dedicado. Clara muestra de que una mayor presencia de la prospectada.

Esta especie, al igual que otras mencionadas en el presente informe, como la terrera común, el bisbita campestre, la carraca y el chorlito carambolo, dependen de zonas no protegidas, que en su mayoría se encuentran en el Parc Agrari y de las que debería contemplarse su protección. Aunque esta especie en concreto, presenta una distribución más homogénea a lo largo de todo el Delta. Para esta especie son significativas zonas agrícolas de Gavà, Viladecans y la Ribera de Sant Boi.

Como se puede observar en la presentación, las observaciones fuera de las Reservas Naturales se han incrementado mucho en los últimos años. Desde el 2012 hasta la fecha, el 48.8 de las citas han sido en zonas no protegidas. Al aplicar el factor de corrección, el desequilibrio es más contundente.

Los hábitats abiertos con mezcla de terrenos agrícolas, junqueras ricas en crasifolios y eriales donde capturar insectos y presas de las que se alimenta son más frecuentes fuera de las zonas protegidas que en su interior, más ocupado por otros hábitats más palustres.

Tabla resumen de “Ficha de carraca europea”

Año	Fuera de ZEPA Nº citas	El Remolar Nº citas	Cal Tet Nº citas	%Fuera ZEPA
2020	4	0	0	100,00
2019	4	6	1	36,36
2018	1	0	2	33,33
2017	6	3	2	54,55
2016	2	5	3	20,00
2015	10	3	0	76,92
2014	5	9	2	31,25
2013	7	5	1	53,85
2012	1	2	0	33,33
2011	0	2	2	,00
2010	0	1	1	,00

Tabla promedio porcentajes con factor de corrección

	Citas trabajo		
Citas fuera ZEPA	40	Teórico fuera ZEPA	134
Citas en ZEPA	50		50
		Teórico total	184
		%Fuera ZEPA	72,83
		% en RRNN	27,17