

Ruiseñor pechiazul (*Luscinia svecica*)

El pechiazul es una especie migrante e invernante regular. Su carácter esquivo hace que no sea fácilmente detectable. Por ello los datos más seguros para su presencia son los que proceden de los anillamientos. De las conclusiones sacadas del anillamiento se deduce que la mayor frecuencia se produce desde finales de agosto hasta primeros de octubre. Como curiosidad, se han capturado ejemplares anillados en Bélgica y Holanda, países de donde parecen proceder la mayoría de aves recuperadas en Catalunya (<http://www.sioc.cat/fitxa.php?sci=0&sp=LUSSVE>).

Se puede observar en prácticamente cualquier tramo del río Llobregat, así como en la mayoría de pequeñas zonas húmedas interiores. Sus hábitos discretos dificultan su observación razón por la cual es más fácil de citar en las zonas más prospectadas de las Reservas Naturales.

El Delta del Llobregat constituye una de las cuatro zonas más relevantes para esta especie en Catalunya.

Censos invernantes

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11	5	10	10	2	5	6	6		5	4

Aportamos el comentario que el Consorci incluye en la “*Memòria de Gestió 2019*” publicada por el **Consorci per a la Protecció i Gestió del Espais Naturals del Delta del Llobregat** en su web:

Memòria de Gestió 2019

Cotxa blava (Luscinia svecica): regular però escassa entre els mesos de gener – abril i setembre - desembre de l’any 2019. El gener de l’any 2019 s’han comptabilitzat 5 exemplars, però segurament és una població subestimada.

Para esta especie adjuntamos una **tabla elaborada con los datos publicados en *Ornitho.cat*** durante los últimos 10 años.

Con el objeto de facilitar su consulta, al final de este mismo documento incluimos el **resumen de la tabla referida** al número de ejemplares contabilizados en las diferentes observaciones.

Las columnas indican las observaciones realizadas en las dos zonas: en la reserva natural y en el conjunto de las zonas no protegidas. En la última columna se obtiene el porcentaje de ejemplares fuera de zonas protegidas respecto al total.

También aportamos, un **plano de distribución en el Delta**.

En este caso **hemos aplicado un factor de corrección**, ya que su presencia no es fácil de detectar. Como se puede observar en el plano, la especie se distribuye por el conjunto del Parc Agrari y el Río. No obstante, las citas referenciadas se concentran en las zonas más visitadas por los observadores.

El Ruiseñor pechiazul se suma al conjunto de especies para las cuales las zonas más protegidas del Delta son manifiestamente insuficientes. Presenta una distribución bastante homogénea a lo largo de todo el Delta, que incluye la mayor parte del Parc Agrari y el río Llobregat.

Los porcentajes de observaciones en las zonas no protegidas durante los últimos años ha sido de un 43% de total de citas y un 46,3% de ejemplares. Al aplicar el factor de corrección sobre el porcentaje de citas, las de las zonas no protegidas se incrementan hasta un 55,4%.

Tabla resumen de “Ficha de datos Ruiseñor pechiazul”

Año	Fuera de ZEPA Nº citas	Les Filipines Nº citas	Ca l'Arana Nº citas	%Citas fuera
2020	3	8	0	27,27
2019	6	1	2	66,67
2018	4	2	5	36,36
2017	6	1	4	54,55
2016	19	12	22	35,85
2015	12	12	1	48,00
2014	5	33	9	10,64
2013	5	3	3	45,45
2012	6	1	2	66,67
2011	16	6	12	47,06
2010	7	8	1	43,75
2009	17	19	7	39,53

Tabla promedio porcentajes con factor de corrección

Citas fuera ZEPA	106	Teórico fuera ZEPA	216,00
Citas en ZEPA	174		174
		Teórico total	390
		%Fuera ZEPA	55,38
		% en RRNN	44,62